

	% des décès
3. Morts violentes . . . . .	56
4. Maladies de l'appareil digestif . . . . .	141
5. „ des organes de la respiration . . . . .	321
6. „ „ „ circulation . . . . .	86
7. „ „ du système nerveux . . . . .	118
8. „ de l'appareil urinaire . . . . .	27
9. „ des organes génitaux et des suites de l'accouchement . . . . .	23
10. Maladies de la peau et du tissu connectif sous-cutané . . . . .	8
11. Maladies de l'appareil de la locomotion . . . . .	15
12. „ infectieuses . . . . .	24
13. „ constitutionnelles générales . . . . .	29
Insuffisance de la déclaration de décès . . . . .	50

#### B. Causes de mort suivant les principales maladies de 1877 à 1893.

Les 86,921 décès de cette période de 17 années ont été causés par :

	% des
1. Affections aiguës des voies respiratoires . . . . .	8,671 soit 99.7
2. Phtisie . . . . .	7,637 „ 87.8
3. Affections du cœur . . . . .	5,098 „ 58.6
4. Entérite des petits enfants . . . . .	4,378 „ 50
5. Apoplexie . . . . .	3,108 „ 38
6. Accidents . . . . .	1,827 „ 21
7. Suicides . . . . .	1,768 „ 20.3
8. Maladies infectieuses (variole, rougeole, scarlatine, fièvre typhoïde, etc.) . . . . .	4,590 „ 51.6
9. Causes diverses . . . . .	49,844 „ 573

#### C. Maladies zymotiques de 1877 à 1893.

Sur les 86,921 décès de cette période, 16,605 ont été causés par des maladies zymotiques.

	Maladies infectieuses %
1. Phtisie . . . . .	7637 45
2. Entérite des petits enfants . . . . .	4378 26.3
3. Diphtérie . . . . .	1448 9
4. Coqueluche . . . . .	663 4
5. Rougeole . . . . .	657 4
6. Fièvre typhoïde . . . . .	636 4
7. Scarlatine . . . . .	560 3.4
8. Fièvre puerpérale . . . . .	351 2
9. Erysipèle . . . . .	219 1.4
10. Variole . . . . .	56 0.3

La mortalité par maladies zymotiques représente le 19 % de l'ensemble des décès.

#### D. Décès causés par les maladies évitables: variole, rougeole, scarlatine, diphtérie, croup, coqueluche, érysipèle, fièvre typhoïde, de 1876 à 1898.

Année	Nombre des décès	Période quinquennale, moyenne annuelle
1876 . . . . .	247	
1877 . . . . .	350	
1878 . . . . .	254	270
1879 . . . . .	257	
1880 . . . . .	242	
1881 . . . . .	295	
1882 . . . . .	230	252
1883 . . . . .	289	
1884 . . . . .	253	
1885 . . . . .	193	
1886 . . . . .	148	
1887 . . . . .	158	177
1888 . . . . .	200	
1889 . . . . .	191	
1890 . . . . .	187	
1891 . . . . .	303	
1892 . . . . .	131	240
1893 . . . . .	359	
1894 . . . . .	246	
1895 . . . . .	161	
1896 . . . . .	200	
1897 . . . . .	162	166
1898 . . . . .	138	

#### Comparaison de la mortalité causée par les maladies zymotiques dans le canton de Vaud et dans l'ensemble de la Suisse. 1877 à 1893.

	Relative à 100 décès		Relative à 10,000 habitants	
	Vaud	Suisse <sup>1)</sup>	Vaud	Suisse
Phtisie . . . . .	8.7	8.8	18.4	20.5
Entérite des petits enfants . . . . .	5.2	—	10.4	—
Diphthérie . . . . .	1.6	2.2	3.5	4.8
Coqueluche . . . . .	0.76	—	1.6	2.5
Rougeole . . . . .	0.75	0.5	1.5	1.2
Fièvre typhoïde . . . . .	0.73	1.2	1.5	2.3
Scarlatine . . . . .	0.64	0.8	1.3	1.7
Fièvre puerpérale . . . . .	0.40	0.5	0.84	1.18
Erysipèle . . . . .	0.28	—	0.52	—
Variole . . . . .	0.06	0.1	0.13	0.27

<sup>1)</sup> Les chiffres de la colonne pour la Suisse sont ceux donnés par le Dr Schmid en 1894 au Congrès de Budapest et en 1895 dans la circulaire pour l'enquête fédérale sur la diphtérie.