

*Maladies vénériennes et syphilitiques chez les enfants de la Maternité.*

Années	Syphilis	Ophthalmie parentale	Pour cent de morbidité spéciale en comparaison du nombre des enfants soignés
1882	—	1	1 : 60 = 1.6
1883	1	3	4 : 60 = 6.6
1884	1	5	6 : 61 = 9.8
1885	6	7	13 : 70 = 18.5
1886	—	5	5 : 75 = 6.6
1887	1	3	4 : 60 = 6.6
1888	2	1	3 : 80 = 3.7
1889	1	2	3 : 90 = 3.3
1890	1	3	4 : 107 = 3.7
1891	—	2	2 : 126 = 1.5
1892	6	5	11 : 132 = 8.3
1893	—	3	3 : 146 = 2
1894	1	5	6 : 175 = 3.4
1895	1	2	3 : 162 = 1.8
1896	—	4	4 : 199 = 2
1897	—	2	2 : 174 = 1.1
21    53			74 : 1777 = 4.1

Dans ces 16 dernières années, sur cent nouveaux-nés, 4 ont été atteints de syphilis ou de maladies vénériennes.

La proportion des maladies spécifiques, très grande jusqu'en 1886, a diminué brusquement de moitié et tend à s'affaiblir depuis 1890.

Le professeur Dr *Rapin* a observé cette même marche descendante dans sa clientèle particulière.

En 1898, recrudescence à la Maternité. Sur 222 enfants 4 ont la syphilis, 6 l'ophtalmie, soit du 4.5%.

**IV. Hospice de l'enfance.** Les affections vénériennes y ont été en s'accroissant depuis quelques années, tandis que la syphilis s'est montrée moins fréquemment.

Années	Vaginites <sup>1)</sup>	Syphilis	Total	Pour cent de morbidité spéciale
1888	1	6	7	0.4
1889	1	5	6	0.3
1890	6	—	6	0.4
1891	9	5	14	0.9
1892	6	7	13	1
1893	14	2	16	1.2
1894	7	2	9	0.9
1895	7	4	11	0.8
1896	1	4	5	0.3
Moyenne des neuf dernières années .				0.7 %

<sup>1)</sup> Les vaginites ont été considérées ici sans distinction comme des affections à gonocoques.

Sur 140 enfants présentés à l'Hospice de l'enfance, il y en a un infecté par la maladie vénérienne.

A la *Maison des enfants malades à Genève*, le rapport de 1894 du Dr *E. Martin* indique sur 396 enfants traités 4 syphilis congénitales et 3 vaginites dont la nature n'est pas spécifiée; en tout 7 cas, c'est-à-dire le 1.7%. En 1895, 5 syphilis congénitales et 3 vaginites sur 417 enfants traités, soit 1.9%.

En 1896, à l'Hôpital des enfants à Zurich, le Dr de *Muralt*, sur 540 malades, signale 13 cas de maladies vénériennes (10 lues congénitales, 2 lues acquis et 1 blennorrhagie vaginale), ce qui représente du 2.4%.

En 1892, le Dr *Burnier* a noté, sur 686 enfants traités à son dispensaire, à Lausanne, 4 syphilis et 5 vulvo-vaginites, soit un enfant sur 80, atteint de maladie vénérienne héréditaire ou acquise, soit une moyenne de 1.3%.

**V. Hôpital ophtalmique.** Le Dr *Marc Dufour*, recteur de l'Université de Lausanne, a eu l'obligeance de nous communiquer la statistique ophtalmique de l'Asile des aveugles, à dater de sa fondation en 1842, par le Dr *Recordon*, jusqu'en 1895. (Voir chapitre Hôpital ophtalmique).

Les tableaux, établis par les soins du Dr de *Speyr*, contiennent les observations de la clinique et de la polyclinique.

Les ophtalmies purulentes des nouveau-nés (blennorrhœa neonatorum) ont été comprises dans les affections vénériennes, bien qu'elles puissent cependant être causées par d'autres microbes que le gonocoque, le pneumocoque par exemple; mais dans la majorité des cas c'est la blennorrhagie qui est l'origine de la maladie.

Nous renvoyons au diagramme du cadastre du Service sanitaire pour les dénombrements annuels.

Selon les périodes quinquennales, le pour cent des malades atteints d'affections syphilitiques ou vénériennes est le suivant:

De 1841 à 1850 . . .	2.58 %
„ 1851 à 1855 . . .	2.12 „
„ 1856 à 1860 . . .	1.26 „
„ 1861 à 1865 . . .	1.34 „
„ 1866 à 1870 . . .	0.66 „
„ 1871 à 1875 . . .	1.32 „
„ 1876 à 1880 . . .	1.86 „
„ 1881 à 1885 . . .	1.94 „
„ 1886 à 1890 . . .	1.76 „
„ 1891 à 1895 . . .	2.30 „

Le prof. Dr *Marc Dufour* a constaté (Discours du Recteur de l'Université de Lausanne en octobre 1892) que, dans les dix premières années de l'existence de l'asile des aveugles, l'ophtalmie des nouveau-nés était la cause de la cécité pour le 44% du nombre