

Ernährungsweise der Kinder, die im Jahre 1907 in Bern an Gastroenteritis starben.

Nach den Erhebungen von Herrn **Herm. Henzi**, Zivilstandsbeamter.

Alter der Kinder	Sterbemonat	Während des Lebens erhielten die Kinder
8 Monate	August	1 3 Monate Muttermilch, darauf Kuhmilch.
3 ¹ / ₂ "	April	1 5 Wochen Muttermilch, nachher Kuhmilch.
5 "	Februar	1 4 Wochen Muttermilch, hernach Galactina 10 Tage, dann auf ärztlichen Rat Staldenmilch, 3 Wochen darauf Spitalpflege.
6 ¹ / ₂ "	Juni	1 4 Wochen Muttermilch, Nestlé mit Kamillentee u. Kuhmilch mit Kamillentee, hernach 3 Monate Spitalpflege (Vater des Vaters tuberkulös).
1 "	September	1 3 Wochen Muttermilch, nachher Kuhmilch mit Wasser u. Haferschleim.
7 ¹ / ₂ "	Mai	1 3 Wochen Muttermilch, dann Kuhmilch mit Kamillentee, darauf Haferschleim.
2 ¹ / ₂ "	Dezember	1 14 Tage Muttermilch, dann Knorrs Hafermehl.
5 ¹ / ₂ "	Mai	1 14 Tage Muttermilch, dann Kuhmilch.
2 "	Februar	1 14 Tage Muttermilch (Mutter fortgeschrittene Tuberkulose), hernach im Notasyl: Kuhmilch mit Gerstenschleim, Galactina, Kinderkakao.
1 "	August	1 2 Wochen Muttermilch, nachher Kuhmilch und Kindermehl.
2 "	Juni	1 4 Tage Muttermilch, nachher Kuhmilch mit Kamillentee.
2 "	Juli	1 Muttermilch (ohne Angabe der Dauer des Stillens), Galactina.
5 Tage	August	1 Muttermilch und Kamillentee.
2 ¹ / ₂ Monate	Mai	1 Muttermilch, dann Nestlé und Kuhmilch.
4 ¹ / ₂ "	Februar	1 Muttermilch, Staldenmilch, dann ärztliche Behandlung.
8 ¹ / ₂ "	Juni	1 Muttermilch, Kuhmilch, Haferschleim, Galactina.
2 "	November	1 Muttermilch, dann Staldenmilch und Galactina.
1 ¹ / ₂ "	September	1 Muttermilch, dann Kuhmilch mit Wasser und Kamillentee.
1 "	November	1 Muttermilch, Haferschleim, Gerstenschleim.
1 ¹ / ₂ "	Dezember	1 Muttermilch, Griesbrei.
5 ³ / ₄ "	Dezember	1 Spitalpflege.
1 "	Juni	1 Kuhmilch.
4 "	März	1 Staldenmilch.
4 "	November	1 Kuhmilch mit Wasser.
1 ¹ / ₂ "	März	1 Kuhmilch mit Zuckerwasser und Kamillentee, dann Spitalpflege.
1 ¹ / ₂ "	Juni	1 2 Wochen Kuhmilch mit Wasser, nachher Kamillentee.
2 ³ / ₄ "	November	1 Kuhmilch mit Wasser, Galactina.
4 "	August	! Kuhmilch, Galactina.
5 ¹ / ₂ "	September	1 Kuhmilch und Galactina.
5 "	Mai	1 Kuhmilch und Galactina, dann Notasyl.
4 ¹ / ₂ "	April	1 Kuhmilch, Nestlé und Hafermehl.
4 ¹ / ₂ "	Oktober	1 Alpenmilch und Nestlés Kindermehl.
1 "	Juli	1 Kuhmilch und Kamillentee, Nestlémehl.
4 "	Dezember	1 Kuhmilch und dann Haferschleim.
1 ¹ / ₂ "	September	1 Kuhmilch, Zwieback und Haferschleim.
7 ¹ / ₂ "	Juni	1 Kuhmilch mit Wasser und Haferschleim, hernach 1 Monat Spitalpflege.
2 ¹ / ₂ "	März	1 Kuhmilch mit Wasser 1 Monat lang, dann Haferschleim, nachher Hofwilmilch mit Wasser.
3 "	Oktober	1 Kuhmilch, Haferschleim, Kindermehl von Lehmann.
1 ¹ / ₂ "	November	1 Kuhmilch mit Wasser, Haferschleim, Zwieback, Griesbrei.
3 "	Juli	1 Nestlés Kindermehl mit Wasser gekocht.

40 Fälle.